Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Tel: (57-1) 8966249 - 8966248
Centro Empresarial Metropolitano Of. B15 Bogotá D.C. – Colombia

FICHA TÉCNICA

TIPO DE FORMULACIÓN: SC (suspensión concentrada)

USO: FUNGICIDA

INGREDIENTES ACTIVOS:

Carbendazim 125g/L Nombre químico: methyl benzimidazol-2-ylcarbamate No. CAS Propiconazole 125 g/L Nombre químico: 1(±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole No. CAS

EMPRESA FORMULADORA: SINOCHEM NINGBO LTD.

21 JiangXia St., Ningbo 315000

China

TITULAR DEL REGISTRO: INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Dirección: Autopista Medellín Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano Ofic. B-15.

REGISTRO NACIONAL ICA: 915

MODO DE ACCIÓN:

KEMPRO SC es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa que es absorbido a través de las raíces y los tejidos verdes con translocación acropetal. Actúa inhibiendo el desarrollo del tubo de germinación del hongo, la formación de apresorios y el crecimiento de micelio. Bioquímicamente actúa inhibiendo la síntesis de beta-tubulina y la biosíntesis del ergosterol.

Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de KEMPRO SC y agite. Adicione el resto del agua.

Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Tel: (57-1) 8966249 - 8966248
Centro Empresarial Metropolitano Of. B15 Bogotá D.C. – Colombia

USO AGRÍCOLA:

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS	P.C	P.R
Arroz (*Oryza sativa.*)	*Pyricularia oryzae,*	0.8 l/há a la aparición de los primeros sintomas 1.0 L/há en presencia de la enfermedad	35 días	12 horas
Tomate (*Lycopersicum sculentum)*	*Alternaria solani*	200 cc/ 200 Litros agua a la aparición de los primeiros sintomas 300 cc/200 litros de agua en presencia de la enfermedad	7 días	12 horas

P.C: Período de Carencia **P.R: Período de Reingreso**

MODO DE EMPLEO

KEMPRO SC se aplica cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad. **KEMPRO SC** es incompatible con productos fuertemente alcalinos.

PRECAUCIONES

El producto es “Moderadamente tóxico” para peces. “Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua”. Peligroso para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

250 cc, 500 cc, 1 litro, 200 litros

Categoría Toxicológica: III Ligeramente Peligroso

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (1) 2886012.

AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición y calidad del producto no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.